



## साइटोमेगालोवायरस (CMV) गर्भावस्था के दौरान माताओं से शिशुओं को होने वाला सबसे आम संक्रमण है।

अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रति वर्ष 2000 बच्चे CMV से संक्रमित पैदा होते हैं। इनमें से लगभग 400 लंबे समय के लिए विकलांग हो जाएँगे, इसमें बहरा हो जाना भी शामिल है।

## अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार:  
स्वास्थ्य-विभाग (Department of Health)  
गर्भावस्था में देखभाल के लिए दिशानिर्देश  
[health.gov.au/resources/  
pregnancy-care-guidelines/](http://health.gov.au/resources/pregnancy-care-guidelines/)

ऑस्ट्रेलिया की कॉन्जेनिटल  
(जन्मजात) सीएमवी एसोसिएशन  
(Congenital CMV Association of Australia)  
[cmv.org.au](http://cmv.org.au)

Cerebral Palsy Alliance  
[cerebralpalsy.org.au/cmv/](http://cerebralpalsy.org.au/cmv/)

RANZCOG  
जन्मजात साइटोमेगालोवायरस संक्रमण की रोकथाम  
[tinyurl.com/RANZCOGpreventCMV](http://tinyurl.com/RANZCOGpreventCMV)

NHMRC  
स्वस्थ बने रहना – बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा व  
देखभाल सेवाओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम करना  
(5वाँ संस्करण)

वायरोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरीज़,  
POW हॉस्पिटल, UNSW  
[virologyresearch.unsw.edu.au](http://virologyresearch.unsw.edu.au)

की एक पहल



## गर्भावस्था के दौरान CMV के जोखिम को कम करना



तो सीएमवी क्या है?  
साइटोमेगालोवायरस (सीएमवी) संक्रमण

## CMV क्या है?

साइटोमेगालोवायरस (CMV) एक सामान्य वायरस है जो शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है।

CMV से संक्रमित अधिकांश स्वस्थ लोग ठीक रहेंगे। कुछ में फ़्लू जैसे लक्षण होंगे, जैसे बुखार और थकान।

यदि कोई गर्भवती महिला CMV से संक्रमित होती है, तो इस बात का खतरा है कि उसका अजन्मा बच्चा भी संक्रमित हो जाएगा। इसे जन्मजात CMV कहा जाता है। जबकि CMV के साथ पैदा होने वाले अधिकांश बच्चे स्वस्थ रहेंगे, लेकिन जन्मजात CMV बहरापन, सेरिब्रल पाल्सी और सीखने की समस्याओं जैसी विकलांगताओं का कारण बन सकता है। कुछ विरले मामलों में CMV जानलेवा हो सकता है।

छोटे बच्चे अपने देखभाल करने वालों को, अपने मूत्र, लार और नाक के बलगम के द्वारा, इस वायरस से संक्रमित कर सकते हैं।

**जो लोग छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं या उनके साथ काम करते हैं, उनमें संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है।**

**सभी गर्भवती महिलाएँ और जो गर्भधारण की योजना बना रही हैं, वे CMV के जोखिम को कम करने के लिए आसान उपायों का पालन कर सकती हैं।**

## संक्रमण का खतरा कम करने के लिए 5 उपाय



नैपी बदलने जैसी गतिविधियों के बाद हाथ धोएँ



भोजन, पेय पदार्थ, बर्तन साझा न करें और बच्चे की डमी या टूथब्रश को अपने मुँह में न डालें



लार के संपर्क से बचें, चुंबन बच्चों के होठों पर करने की बजाय उनके माथे पर करें



इस्तेमाल किए गए वाइप्स, टिशू और नैपी को सावधानीपूर्वक फेंकें



उन खिलौनों को साफ़ करें, जिनसे बच्चे खेले हैं

यदि हाथ धोना संभव नहीं है, तो एल्कोहॉल आधारित हैंड सैनिटाइज़र एक अच्छा विकल्प है।

**इन उपायों से सर्दी/फ़्लू और दस्त जैसी अन्य बीमारियों का खतरा भी कम होगा। अच्छी स्वच्छता की बातों का पालन करते रहने से परिवार और बच्चे स्वस्थ और सशक्त रहते हैं।**

## क्या आप CMV के लिए जाँच करा सकती हैं?

सभी गर्भवती महिलाओं को CMV के लिए स्क्रीनिंग कराने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि किसी महिला को CMV होने का संदेह है (उसमें लक्षण दिखाई देते हैं या अल्ट्रासाउंड के परिणाम असामान्य हैं) तो उसे जाँच कराने सलाह दी जा सकती है।

गर्भावस्था के दौरान CMV से संक्रमित माताओं के पैदा हुए बच्चों की या सुनने की शक्ति की जाँच में विफल रहने वाले नवजात बच्चों की CMV के लिए जाँच कराने का सुझाव दिया जाता है।

CMV से संक्रमित पैदा हुए बच्चों की सुनने व देखने की शक्ति की नियमित रूप से जाँच करवानी चाहिए। कभी-कभी, हो सकता है जन्म के समय इन समस्याओं का पता न चले।

## क्या CMV का इलाज किया जा सकता है?

गर्भवती महिलाओं को, जिनमें CMV के होने का पता चलता है, उन्हें उपचार के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए।

प्रारंभ में एंटीवायरल उपचार उन बच्चों की मदद कर सकता है जो CMV से संक्रमित हैं और जन्म के समय बीमार हैं। उपचार के बारे में डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए।